

Outil d'autodiagnostic de la mouche du bleuet

- Charles-A. D. Bouchard M. Sc.
- Anne Schmitt M. Sc.


Cliquez ici
pour voir les
instructions →

Instructions



Instructions

L'outil d'autodiagnostic fonctionne comme un questionnaire, vous serez donc appelé à naviguer en cliquant sur des boutons comme ceux-ci:



Utiliser uniquement les boutons pour naviguer de page en page.

Pour revenir en arrière, utiliser le bouton annuler comme celui-ci:



Instructions
(suite)

Instructions

Les choix que vous sélectionnerez vous aideront à identifier les méthodes à risques, représentées par ce symbole:



Les méthodes les plus efficaces et sécuritaires seront représentées par ce symbole:



Au final, une note vous sera attribuée.

Cliquez sur le bouton Débuter pour commencer. →

DÉBUTER

1. Dépistage

Avez-vous déjà fait du dépistage de la mouche du bleuet dans votre entreprise?

OUI

NON

← ANNULER

1. Dépistage



Excellent! la mouche a été détectée depuis plus de 5 ans dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le dépistage permet au producteur de connaître la situation dans son entreprise. Le producteur va donc pouvoir prendre les actions nécessaires afin de **protéger son entreprise** ainsi que d'aider à **protéger les entreprises de l'ensemble du secteur du bleuet sauvage.**

CONTINUER

ANNULER



1. Dépistage




Attention! La mouche a été détectée depuis plus de 5 ans dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le dépistage permet au producteur de connaître la situation dans son entreprise. Le producteur va donc pouvoir prendre les actions nécessaires afin de **protéger son entreprise** ainsi que d'aider à **protéger les entreprises de l'ensemble du secteur du bleuet sauvage.**

CONTINUER

ANNULER



1. Dépistage



Avez-vous capturé des mouches antérieurement?

OUI

NON

← ANNULER

1. Dépistage

Il est conseillé d'installer annuellement entre 3 et 5 pièges sentinelles pour détecter la présence de la mouche du bleuet. Vous pourrez donc savoir si le ravageur est présent et s'il vous faut prendre des actions.

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Il est conseillé d'installer annuellement entre 3 et 5 pièges sentinelles pour détecter la présence de la mouche du bleuet. Vous pourrez donc savoir si le ravageur est présent et s'il vous faut prendre des actions.

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Attention! Il est important de poursuivre le dépistage annuel de votre bleuetière. Il est primordial de connaître l'importance de la population du ravageur et leur positionnement dans votre entreprise. Il est important d'avoir ces données afin que votre conseiller(ière) puisse recommander un traitement localisé, au besoin.

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Selon la superficie de votre entreprise, un nombre de pièges est requis afin de faire un dépistage efficace. Installez-vous le nombre requis minimal?

2 ha ou moins
4 pièges

Entre 3 et 5 ha
6 pièges

Entre 6 et 16 ha
15 pièges

Plus de 16 ha
1 piège par ha
(max 20)

OUI

NON

ANNULER

1. Dépistage



Excellent! Un nombre minimal de pièges est requis pour avoir un dépistage efficace et au besoin, une recommandation de traitement par un conseiller(ière).

2 ha ou moins
4 pièges

Entre 3 et 5 ha
6 pièges

Entre 6 et 16 ha
15 pièges

Plus de 16 ha
1 piège par ha
(max 20)

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage



Attention! Un nombre minimal de pièges est requis pour avoir un dépistage efficace et au besoin, une recommandation de traitement par un conseiller(ière). Il serait important d'ajouter des pièges.

2 ha ou moins
4 pièges

Entre 3 et 5 ha
6 pièges

Entre 6 et 16 ha
15 pièges

Plus de 16 ha
1 piège par ha
(max 20)

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Les pièges doivent être installés en pourtour des champs en production (8-10 m à l'intérieur). Idéalement près des brise-vent ou hautes herbes.



1. Dépistage

Les pièges doivent être installés à l'aide d'un piquet planté à 45°. Ils sont accrochés à environ 30 cm au-dessus de la cime des bleuetiers.



1. Dépistage

Numéroter les pièges et noter les emplacements sur une carte.



CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Relever les pièges une fois par semaine et noter les captures dans un registre. Une fois comptée, retirer la mouche. Les pièges doivent être changés aux 3 semaines maximum.

Registre de dépistage de la mouche du bleuet 2025													
Site - Bleuetière X													
Date	Numéro du piège										Total	Initiale du dépisteur	Commentaires
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2025-06-13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Piquetage
2025-06-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-06-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage + Changement de pièges
2025-07-11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4		Dépistage
2025-07-17	0	0	0	4	0		0	0	0	2	6		Dépistage
2025-07-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-08-01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		Dépiquetage
												Total	11
Piège changé													
Récolte													
Dépiquetage													
Traitement													

CONTINUER

ANNULER



2. Seuil d'intervention

Lorsqu'un piège obtient plus de **7 captures par semaine**, il atteint son seuil d'intervention.

Identifier sur une carte où sont placés les pièges concernés et contacter votre conseiller(ière).

Dépendamment de votre historique, de la date d'atteinte du seuil ou encore de l'importance de la présence de la mouche, un traitement localisé pourrait vous être recommandé.

CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Les pièges doivent être installés en pourtour des champs en production (8-10 m à l'intérieur). Idéalement près des brise-vent ou hautes herbes.



1. Dépistage

Les pièges doivent être installés à l'aide d'un piquet planté à 45°. Ils sont accrochés à environ 30 cm au-dessus de la cime des bleuetiers.



1. Dépistage

Numéroter les pièges et noter les emplacements sur une carte.



ANNULER

CONTINUER

1. Dépistage

Relever les pièges une fois par semaine et noter les captures dans un registre. Une fois comptée, retirer la mouche. Les pièges doivent être changés aux 3 semaines maximum.

Registre de dépistage de la mouche du bleuet 2025														
Site - Bleuetière X														
Date	Numéro du piège										Total	Initiale du dépisteur	Commentaires	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2025-06-13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Piquetage
2025-06-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-06-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage + Changement de pièges
2025-07-11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4		Dépistage
2025-07-17	0	0	0	4	0		0	0	0	2	6			Dépistage
2025-07-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-08-01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1			Dépiquetage
											Total	11		
Piège changé														
Récolte														
Dépiquetage														
Traitement														



3. Biosécurité

Avez-vous un plan de biosécurité?

OUI

NON

← ANNULER

3. Biosécurité

Avez-vous un plan de biosécurité?

OUI

NON

← ANNULER

2. Biosécurité



Excellent! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



2. Biosécurité



Attention! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet


Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **100%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.



3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **75%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Point à améliorer:

Vous devez implanter une station de biosécurité.



3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **75%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Point à améliorer:

Vous devez vous munir d'un plan de biosécurité.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **50%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez vous munir d'un **plan de biosécurité**.

Vous devez **implanter une station de biosécurité**.



2. Biosécurité



Excellent! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



2. Biosécurité



Attention! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuetière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

1. Dépistage

Les pièges doivent être installés en pourtour des champs en production (8-10 m à l'intérieur). Idéalement près des brise-vent ou hautes herbes.



3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

ANNULER

1. Dépistage

Les pièges doivent être installés à l'aide d'un piquet planté à 45°. Ils sont accrochés à environ 30 cm au-dessus de la cime des bleuetiers.



3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Numéroter les pièges et noter les emplacements sur une carte.



CONTINUER

ANNULER

1. Dépistage

Relever les pièges une fois par semaine et noter les captures dans un registre. Une fois comptée, retirer la mouche. Les pièges doivent être changés aux 3 semaines maximum.

Registre de dépistage de la mouche du bleuet 2025														
Site - Bleuetière X														
Date	Numéro du piège										Total	Initiale du dépisteur	Commentaires	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2025-06-13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Piquetage
2025-06-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-06-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage + Changement de pièges
2025-07-11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4		Dépistage
2025-07-17	0	0	0	4	0		0	0	0	2		6		Dépistage
2025-07-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-08-01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		Dépiquetage
													Total	11

Piège changé
Récolte
Dépiquetage
Traitement

CONTINUER

ANNULER



3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

2. Seuil d'intervention

Lorsqu'un piège obtient plus de **7 captures par semaine**, il atteint son seuil d'intervention.

Identifier sur une carte où sont placés les pièges concernés et contacter votre conseiller(ière).

Dépendamment de votre historique, de la date d'atteinte du seuil ou encore de l'importance de la présence de la mouche, un traitement localisé pourrait vous être recommandé.

CONTINUER

ANNULER

3. Biosécurité

Avez-vous un plan de biosécurité?

OUI

NON

← ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **75%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Augmenter le nombre de pièges dans votre bleuetière.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **50%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez implanter une station de biosécurité.

Augmenter le nombre de pièges dans votre bleuetière.



2. Biosécurité



Excellent! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



2. Biosécurité



Attention! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter les informations pour mettre en place une station de biosécurité dans votre bleuetière.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **50%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez vous munir d'un **plan de biosécurité**.

Augmenter le nombre de pièges dans votre bleuetière.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **25%**.

Continuer vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez vous munir d'un **plan de biosécurité.**

Vous devez **implanter une station de biosécurité.**

Augmenter le nombre de pièges dans votre bleuetière.



3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

ANNULER

3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **100%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **66%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Point à améliorer:

Vous devez implanter une station de biosécurité.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **66%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Point à améliorer:

Vous devez vous munir d'un plan de biosécurité.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **33%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez vous munir d'un plan de biosécurité.

Vous devez implanter une station de biosécurité.



1. Dépistage

Les pièges doivent être installés en pourtour des champs en production (8-10 m à l'intérieur). Idéalement près des brise-vent ou hautes herbes.



1. Dépistage

Les pièges doivent être installés à l'aide d'un piquet planté à 45° . Ils sont accrochés à environ 30 cm au-dessus de la cime des bleuetiers.



1. Dépistage

Numéroter les pièges et noter les emplacements sur une carte.



ANNULER

CONTINUER

1. Dépistage

Relever les pièges une fois par semaine et noter les captures dans un registre. Une fois comptée, retirer la mouche. Les pièges doivent être changés aux 3 semaines maximum.

Registre de dépistage de la mouche du bleuet 2025													
Site - Bleuetière X													
Date	Numéro du piège										Total	Initiale du dépisteur	Commentaires
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2025-06-13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Piquetage
2025-06-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-06-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage + Changement de pièges
2025-07-11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4		Dépistage
2025-07-17	0	0	0	4	0		0	0	0	2	6		Dépistage
2025-07-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dépistage
2025-08-01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		Dépiquetage
												Total	11

Piège changé
Récolte
Dépiquetage
Traitement

CONTINUER

ANNULER

2. Seuil d'intervention

Lorsqu'un piège obtient plus de **7 captures par semaine**, il atteint son seuil d'intervention.

Identifier sur une carte où sont placés les pièges concernés et contacter votre conseiller(ière).

Dépendamment de votre historique, de la date d'atteinte du seuil ou encore de l'importance de la présence de la mouche, un traitement localisé pourrait vous être recommandé.

CONTINUER

ANNULER

3. Biosécurité

Avez-vous un plan de biosécurité?

OUI

NON

← ANNULER

2. Biosécurité



Excellent! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



2. Biosécurité



Attention! Un plan de biosécurité permet de réduire la présence du ravageur dans votre entreprise et d'éviter de contaminer d'autres secteurs de votre bleuëtière. La biosécurité permet aussi de contrôler les maladies et l'introduction de semences de mauvaises herbes. Consulter la Trousse de biosécurité pour plus d'infos.

Consulter les informations sur internet

CONTINUER

ANNULER



3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

3. Biosécurité

Possédez-vous une station de biosécurité à l'entrée de votre bleuetière?

OUI

NON

← ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Excellent! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité



Attention! Les stations de biosécurité sont un élément essentiel d'un plan de biosécurité efficace.



CONTINUER

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

3. Les stations de biosécurité

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les stations de biosécurité sur internet.

Consulter les informations sur internet

Mettre fin à l'outil d'autodiagnostic

ANNULER

4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Félicitation! Votre pointage est de **66%**.

Continuez vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.



Point à améliorer:
**Vous devez débiter un dépistage
avec 3 à 5 pièges sentinelles.**



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **33%**.

Continuer vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez **débuter un dépistage** avec 3 à 5 pièges sentinelles.

Vous devez **implanter une station de biosécurité**.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **33%**.

Continuer vos efforts et n'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez **débuter un dépistage** avec 3 à 5 pièges sentinelles.

Vous devez vous munir d'un **plan de biosécurité**.



4. Fin de l'outil d'autodiagnostic et pointage

Attention! Votre pointage est de **0%**.

Il serait important de commencer à poser des actions. N'hésitez pas à consulter votre conseiller(ière) pour plus d'informations.

Points à améliorer:

Vous devez débiter un dépistage avec 3 à 5 pièges sentinelles.

Vous devez vous munir d'un plan de biosécurité.

Vous devez implanter une station de biosécurité.

