

## 4.5.2.7 Sercadis (fluxapyroxad)

### LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

L'étiquette du pesticide est la seule source d'information ayant force de loi et elle contient toute l'information liée à l'utilisation du produit commercial. Le présent document est un résumé de l'étiquette. Lorsqu'il est question de répression, l'efficacité approximative du produit est de 60-75 % tandis qu'une suppression est de 85 % et plus. Il est important de toujours se référer à l'étiquette légale qui est disponible soit sur le contenant du pesticide ou soit sur le site internet de l'ARLA : <http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/lr-re/index-fra.php>. Veuillez vous assurer que vous avez la plus récente mise à jour de ce résumé d'étiquette.

**Toujours aviser votre acheteur pour les applications des pesticides dans votre culture.**

Fait avec l'étiquette du 31-08-2023

### RÉSUMÉ DE L'ÉTIQUETTE

- Groupe 7
- Indice de risque pour la santé (IRS)<sup>1</sup> : 122
- Indice de risque pour l'environnement (IRE)<sup>2</sup> : 93
- Maladies à traiter :
  - Suppression de la **tache septorienne**;
  - Répression de la **moisissure grise**.
- Moment d'application :
  - Débuter les applications **avant le développement de la maladie** et poursuivre en respectant un intervalle de **7 à 14 jours** entre les applications;
  - Utiliser l'intervalle le plus court et/ou la dose la plus élevée lorsque la pression de la maladie est forte.
- Taux d'application et mélange :
  - Dose d'application : 0,250 à 0,666 L/ha;
  - Taux d'application : minimum 100 L/ha.

<sup>1</sup> La valeur de l'IRS varie de 1 à 2 420. Plus le chiffre est élevé, plus le risque qu'il représente au niveau de la santé est important.

<sup>2</sup> La valeur de l'IRE varie de 1 à 961. Plus le chiffre est élevé, plus le risque qu'il représente pour l'environnement est important.

#### 4.5.2.7 Sercadis (fluxapyroxad)

- Renseignements sur le produit :
  - Fongicide à large spectre qui inhibe la germination des spores, le développement mycélien et la sporulation des champignons à la surface du feuillage;
  - Le contrôle optimal de la maladie est atteint lorsque le fongicide est appliqué en prévention selon un programme régulier de pulvérisation et est utilisé en rotation avec d'autres fongicides.
- Restrictions :
  - Application terrestre;
  - Nombre d'application maximale par saison : 3 applications;
  - **NE PAS** faire plus de **deux (2) applications séquentielles**;
  - Dose de **produit maximale** pendant la saison : 2 L de produit/ha;
  - La hauteur de la rampe du pulvérisateur doit être de 60 cm ou moins au-dessus de la culture ou du sol;
  - Ce fongicide est **persistant et a des effets rémanents**. Il est recommandé que tout produit renfermant du fluxapyroxad ne soit pas utilisé dans les zones traitées avec ce produit lors de la saison précédente;
  - Éviter d'appliquer lorsque de **fortes pluies** sont prévues
  - **Délai de réentrée** : 12 heures;
  - **Délai avant récolte** : 0 jour;
  - Zones tampons : 1 m des fossés, 15 m des habitats d'eau douce, 30 m des puits et 1 m des habitats terrestres.
- Entreposage :
  - Pour éviter la contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou des aliments pour animaux.
- Rinçage :
  - Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir;
  - Rendre le contenant inutilisable.
- Équipements de protection :
  - Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures lors du mélange, du remplissage, de l'application, du nettoyage et des réparations;
  - Porter des lunettes de protection ou un écran facial lors du mélange et du remplissage.

#### RÉDACTION 2021

Laurence Bouchard, agronome, Club Conseil Bleuets, Dolbeau-Mistassini

#### MISE À JOUR 2024

Cléo Côté, agronome, Club Conseil Bleuets, Dolbeau-Mistassini

#### FINANCÉE PAR

